+ Un homme agé de 50 ans ressentit en 1745. une douleur sourde et inquietante dans la region du Rein gauche qui subsista fort longtemps et qui par intervalle se changea en colique nefretique. les vrines devinrent malles, troubles et d'une puanteur insupportable: elles deposerent de tems en temps du graviers et du pus

abcès au rein. ces accidens donnerent lieu de soupçonner la pierre; la sonde ne l'ayant pu decouvrir dans la vessie on la jugea dans le Rein. les remedes convenables et de

n.° 37. toutes especes furent employés sans aucun succés. cependant la douleur du rein devint lancinante, le malade g sentit des batemens. la fievre, de lente qu'elle etoit, se rendit continüe; le coté se tumefia et aprés six ans de souffrances parut un abcés dont l'on fit l'ouverture, il en sortit une quantité de deux bouteilles de pus tres fetide. le malade fut soulagé par cette grande evacuation; la playe fut pancée et guerie au bout de six mois. peu-apres les douleurs reprirent de nouvelles forces, la cicatrice se boursoufla et la playe se rouvrit: elle donna issüe avec grande quantité de pus qui soulagea de nouveau le malade; on la sonda et l'on trouva un corps dur peu enfoncé l'on dilata la playe et l'on fit avec le secours d'une petite tenette l'extraction d'une pierre du poids de deux onces et demie. a peine cette grosse pierre fut-elle sortie que les douleurs s'appaiserent, le malade dormit, la playe parut se remplir de bonnes chairs, cela fit naître les esperances les plus flateuses, quand tout a coup la fiévre survint, accompagnée de soif, d'inquietude, de frissons irreguliers, de redoublemens &c.ª il se fit un reflux de matiere purulente et le malade mourut dans le marasme.

M. Lesco maître en chirurgie de cette Ville qui eut soin du malade conjointement avec M. Saravin medecin ne purent obtenir l'ouverture du cadavre, ce qui met M. ~~[illegible]~~ Castaner dans l'impossibilité de rendre compte de l'etat des parties ou etoit le siége de la maladie. ce qu'il ose pourtant assurer de plus positif, c'est que le colon devoit-être percé du coté du rein car une partie des lavemens que le malade recevoit s'echappoient par l'ouverture exterieure de l'abcés.

1.d

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. N.°
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 24 d.133